

Tabel 2 – Alarmsymptomen

<i>Symptomen</i>	<i>Opmerking</i>
<u>Algemeen:</u>	
- Begin van symptomen na leeftijd van 6 maanden of toenemend/persisterend na de leeftijd van 12 maanden	Kan passen bij een andere diagnose dan GORZ op basis van het natuurlijk beloop van GORZ
- Dysurie	Kan passen bij een urineweginfectie, met name bij jongere kinderen
- Failure to thrive/gewichtsverlies	Kan op verschillende onderliggende oorzaken wijzen, zoals infectie
- Koorts	
- Lethargie	
- Overmatige prikkelbaarheid/pijn	
<u>Neurologisch:</u>	
- Bolle fontanel/snel toenemende hoofdomtrek	Kan passen bij verhoogde intracranieële druk, door bijvoorbeeld een tumor of meningitis
- Epileptische insulten	
- Macro/microcefalie	
<u>Gastro-intestinaal:</u>	
- Bloed in ontlasting	Kan meerdere oorzaken hebben, zoals bacteriële gastro-enteritis, inflammatoire darmziekte of gastroenteropathie
- Chronische diarree	Kan passen bij gastroenteropathie
- Galkleurig braken	Symptoom van intestinale obstructie, bijvoorbeeld bij M. Hirschsprung, atresie, invaginatie of volvulus
- Hematemesis	Kan passen bij bloeding van de slokdarm, maag of dunne darm. Mogelijk als gevolg van GORZ (reflux-oesofagitis, Mallory-Weiss)
- Nachtelijk braken	Kan passen bij een hersentumor
- Persisterend krachtig braken	Kan passen bij pylorushypertrofie (zuigelingen tot leeftijd van 2 maanden)

Symptomen gesorteerd op alfabet