

Tabel 5.3.1 Anamnese en lichamelijk onderzoek

Anamnese en l.o.	Suggestief voor obstipatie	Alarmsymptoom (zie tabel 5.3.2)
Meconiumlozing	≤ 48 uur na geboorte	> 48 uur
Defecatiefrequentie	≤ 2 per week, grote hoeveelheid	
Consistentie	Hard, keutelig (zie nr 1 en 2 van de Bristol ontlastingsschaal*)	
Problemen rondom defecatie	Pijn voor, tijdens en na de defecatie, ophoudgedrag, bloed bij de ontlasting	Bloederige diarree
Fecale incontinentie	> 1/week, elk moment van de dag mogelijk	Smeren met ontlasting (cave seks.misbruik)
Overig	Verminderde eetlust, toename buikpijn voor defecatie en afname na defecatie, urine-incontinentie urinewegsinfecties	Vermoeidheid, koorts, gallig braken, eczeem
Medicatiegebruik		
Psychosociale anamnese, life events (ook seks. misbruik)		
Familie-anamnese		
Lichamelijk onderzoek		
Algemeen		Failure to thrive, koorts, bloed door ontlasting. Extreme angst voor anale inspectie/ rectaal toucher (cave seks.misbruik)
Abdomen	Feces palpabel	Forse distensie
Anus	Vol rectum (zie vraag 5.2), peri-anale roodheid, peri-anale feces	littekens anus, hematomen, peri-anale fissuren, hemorroïden (seks.misbruik),

Neurologisch onderzoek	Aanwezige anusreflex (Hoeft niet standaard door huisarts verricht te worden)	Peri-anale fistel, abnormale anus Afwezige anusreflex, verminderde kracht/tonus/ reflexen benen
Huid/bot		Hematomen (seks.misbruik) Wervelkolom: pluk haar, sacrale dimple (indeuking), spina (event. scheve bilnaad)